quickwhite.net

Especialistas en Blanqueamiento dental

Instrucciones Kits QuickWhite

Blanqueamiento en clínica y mantenimiento domiciliario

ALIMENTOS PERJUDICIALES DURANTE LAS 72 H. SIGUIENTES AL BLANQUEAMIENTO

Tabaco
Café
Té
Colas
Vino tinto
Vino rosado
Mosto
Alcachofa
Remolacha
Cerezas

Fresas
Moras
Frambuesas
Granadas
Sandía
Uvas negras
Chocolate
Cacao
Zanahoria
Brócoli

Espinacas
Tomate frito
Tinta calamar
Guisos con colorante o azafrán. (Ej. paella, estofados).
Cualquier alimento de fuerte coloración.

CENTRO ESPECIALIZADO:

Cita: / / Tel.:

ADVERTENCIAS ANTES DE REALIZAR EL BLANQUEAMIENTO

1. QuickWhite, cuando es usado correctamente, blanqueará la mayoría de las dentaduras con un notable resultado. De cualquier modo debe evitar crear falsas espectativas o garantías al paciente a cerca del resultado.

2. Los pacientes con dientes amarillo-marrones oscuros tienden a responder al tratamiento mejor que los de color gris o rojizo.

3. Aunque no existen datos que refieran daño o factores de riesgo para el diente, es importante que el paciente sea informado con prioridad a cerca de la posible molestia que puede experimentar, tales como sensibilidad durante las primeras 24 h. Dichas molestias desaparecerán en unos 2 días, pero a los pacientes más propensos se les puede aplicar flúor o recomendar algún analgésico.

4. El tratamiento de caries, así como otras enfermedades, deben ser realizados antes del blanqueamiento.

5.La protección gingival es esencial para evitar la irritación de la misma durante el tratamiento, por lo que es fundamental cubrir bien los cuellos descubiertos con 1 mm. de grosor sobre el margen gingival, así como cubrir los bordes incisivos desgastados y diastemas.

6. No exponer el contenido de los kits a luz excesiva. El peróxido de hidrógeno debe mantenerse refrigerado y sacar del frio 15 min. antes de realizar el tratamiento.

7. No usar el gel mezclado una vez que pasen 50 min.

8. Si el gel entra en contacto con tejidos blandos, enjuagar inmediatamente con agua abundante y aplicar vitamina E en la zona afectada.

Dentalsur 2003, S.L., Avda. de la Paloma 48, Entreplanta, Of. G, 29003 Málaga - Tel. 952 04 00 57 - Fax. 952 04 00 57

INSTRUCCIONES TRATAMIENTO EN CLINICA

1.Saque el bote de peróxido de hidrógeno del frigorifico una hora antes de comenzar el tratamiento.

2. Examine los dientes y compruebe cual es el tono inicial del diente antes de la aplicación del tratamiento con la guía VITA ordenada de la siguiente manera: B1, A1, B2, D2, A2, C1, C2, D4, A3, D3, B3, A3.5, B4, C3, A4, C4.

3. Tomamos registro fotográfico del tono inicial.

4. Coloque el retractor labial. De un pulido con la pasta de piedra pómez incluida en el kit para eliminar posibles impurezas. Nunca usar pastas que contengan glicerina, gomas o aceites.

5. Seque la dentadura y la encía con aire comprimido y seguidamente aplique la protección de la encía cubriendo completamente todos los tejidos. Polimerizar la resina protectora. Precaución: una sobreexposición de la resina a la lámpara puede causar aumento de calor en la encía.

6. Mezclar el peróxido de hidrógeno con los polvos fotoactivadores hasta obtener una suave pasta, con una consistencia de gel, cómoda para trabajar. Aplique el producto al diente en la cara vestibular con un grosor de capa como de unos 2 mm. Una vez aplicado el gel cierre el bote para que minimizar la activación del producto entre exposición y exposición.

7. Si usa el sistema LumaCool, coloque la cabeza de la lámpara a menos de 2 cm de los labios. Ajuste el tiempo y deje activar el producto durante los 8-10 minutos del ciclo.
Si no usa un sistema de doble arcada, comience el ciclo de 10 minutos con su lámpara de polimerizar a unos 6-7 mm de la superficie del diente cambiando cada 3 segundos de diente hasta completar el ciclo de los 10 minutos.

8. Una vez concluido el primer ciclo retiramos el gel aspirando pieza a pieza cuidadosamente y volvemos a aplicar el producto y a exponer a la luz. No es necesario retirar la resina protectora, ésta nos va a servir para todo el tratamiento.

9. Una vez realizado el segundo ciclo volvemos a aspirar el producto, enjuagar si es necesario. Si aún no hemos obtenido el resultado deseado, podemos volver a realizar un tercer ciclo exactamente igual a los anteriores. Como máximo realizar 3 ciclos de 10 min.

10. Enjuagamos y retiramos el protector gingival.

11. Para terminar damos el toque final aplicando la pasta de diamante LUMINESCENCE.

12. Comprobamos la nueva tonalidad del diente y tomamos registro fotográfico de nuevo para comparar con el tono inicial.

13. Entregamos la/s jeringa/s para el mantenimiento en casa, así como las férulas.

INSTRUCCIONES PARA CASOS TETRACICLINICOS

1. Realizar el blanqueamiento en clínica con el sistema LumaCool según las instrucciones anteriores, pero realizando únicamente dos ciclos de 10 minutos de exposición cada uno. Incluido el pulido final con LUMINESCENCE
2. Entregar al paciente dos jeringas de mantenimiento domiciliario quien debe de seguir las instrucciones de mantenimiento hasta agotar el producto.
3. Dejar 20 días de descanso desde el fin del tratamiento domiciliario.
4. Volver a realizar el tratamiento en clínica con dos ciclos de 10 min. de exposición y si es necesario aplicar un tercer ciclo.
5.- Volver a entregar otras dos jeringas de mantenimiento domiciliario y aplicar hasta agotar el producto.

NOTA: COMO SE APRECIA EN ESTOS CASOS SE USA EL DOBLE DE PRODUCTO POR LO QUE EL COSTE PARA EL PACIENTE ES MAYOR

INSTRUCCIONES TRATAMIENTO EN CASA

1. El paciente en su casa, debe cepillarse los dientes y pasar la seda dental antes de su uso.
2. Retirar el tapón blanco de la jeringa y poner una de las puntas incluidas (Las puntas son reutilizables por lo que deben ser guardadas para el siguiente día)
3. Realizar el vertido del producto sobre la cara vestibular de la férula (la que va a estar en contacto con la superficie dental a blanquear). Repetir lo mismo con la otra férula para la otra arcada.
4. Colocar las férulas sin morder excesivamente. Evitar tragar el producto.
5. No coma ni beba durante el proceso
6. Tras 30-40 min. con las férulas puestas quitar y enjuagar con agua abundante.
7. Volver a cepillar para retirar posibles restos.
8. Repetir el proceso diariamente hasta agotar el producto. Aplicar justo antes de ir a dormir.